

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NK'LI SIVI ORGANOMİNERAL GÜBRE
CET 46 GREEN

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Toplam Organik Madde	%24
Toplam Azot (N)	%3
Organik Azot (N)	%2
Üre Azotu (N)	%1
Suda çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	% 7
Alginik asit	%0.8
Maksimum Klor (Cl)	%4
pH	7-9

ÖZELLİKLERİ

CET 46 GREEN, içerisindeki organik madde ve besin maddeleri sayesinde meyve olgunlaşma sürecinde kullanılması tavsiye edilir.

DOZ VE KULLANIM TALİMATLARI
YAPRAKTAN UYGULAMA

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	UYGULAMA SAYISI	UYGULAMA DOZU
Yumuşak* ve taş çekirdekli	Hasattan 15 gün ve 7 gün önce	2 uygulama	400-600 mL/da
Şarap ve sofralık üzüm	Hasattan 20-15 gün ve 10-7 gün önce	2 uygulama	400-500 mL/da
	Veya Hasattan 8-10 gün önce	1 uygulama	800 mL/da
Narenciye	Hasattan 25-20 gün ve 15-10 gün önce	2 uygulama	500 mL/da
	veya Hasattan 15 gün önce	1 uygulama	800-1000 mL/da
Zeytin	Hasattan 10-7 gün önce	1 uygulama	600-800 mL/da
Sebzeler (domates ve biber)	Hasattan 12-10 gün ve 5-6 gün önce	2 uygulama	400-600 mL/100 L (800 ml/100 L; Düşük ışık ve sıcaklığa sahip ortamlarda)
Sanayi domatesi	Hasattan 15 gün ve 7 gün önce	2 uygulama	400-500 mL/da
	veya Hasattan 10 gün önce	1 uygulama	800 mL/da
Karpuz, kavun	Hasattan 15 gün ve 7 gün önce	2 uygulama	400-500 mL/da
Çilek	Düşük ışık ve sıcaklığa sahip ortamlarda hasattan 10-8 gün ve 5-4 gün önce	2 uygulama	400-600 mL/100 L
Kesme çiçekler	Çiçekler renklenmeye başladığında ve 7-10 gün sonra	2 uygulama	300-400 mL/100 L

*Kademeli olgunlaşan elma çeşitlerinde birinci ve ikinci toplama arasında üçüncü bir uygulama yapılır.

Normal su dağıtım hacimleri için dozajlar hesaplanmıştır.

Geç renklenmiş çeşitlerde, önerilen yüksek doz kullanılması tavsiye edilir.

Dozajlar sadece gösterge niteliğindedir ve belirli toprak, iklimsel ve tarımsal koşullara göre değerlendirilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK

Ürün, bakırlı, mineral yağ ve emulsiyon bazlı ürünler haric tüm diğer tüm zirai ilaç ve gübrelere karışabilir. Her zaman ön karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir. Cifo S.r.l. tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek durumlar (toksikite, kalıntılar, vs) kullanıcının sorumluluğundadır.

Daha fazla ayrıntı için lütfen teknik departmanımıza başvurunuz.

UYARILAR

Ürün standart sıcaklıklarda ve basınçta stabildir. Güvencesiz depolamadan kaçınarak dikkatli saklayın. Ürünü 5 ° C ile 30 ° C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Çocuklardan uzak tutunuz, Koruyucu eldiven ve maske kullanınız. Deri ve göz ile temasından kaçınınız ve teması halinde bol su ile yıkayınız. Kullanılmış boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayınız ve imha ediniz.* Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

KULLANMADAN ÖNCE ÇALKALAYINIZ.

ÜRETİCİ FIRMA

CIFO S.r.l. Via Oradour 6/8 – 40016 San Giorgio di Piano (BO) – ITALY

İTHALATÇI FIRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD ŞTİ.

Çınarlı Mah. 61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81

Seyhan / Adana / TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 - Fax: +90 322 456 25 66

HACİM : 5 L

Üretim Tarihi:

Son Kullanma Tarihi: Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tescil No:

Lisans no:

Parti No:

İtalya'dan ithal edilmiştir.

Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 7223 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemi peşinen kabul ederiz.

CİFAGRO
Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 209 049 0355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili