

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ HARMANLANMIŞ
FLORAL K 12-5-35 + ME

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

	(W / W)
Toplam Azot (N)	
- Nitrat Azotu	%12
- Amonyak Azotu (N)	%10
Suda Çözünür Fosforpenta Oksit (P ₂ O ₅)	%2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	%5
Suda Çözünür Bor (B)	% 35
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Bakır (Cu)	%0,1
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Mangan (Mn)	%0,1
Suda Çözünür EDTA ile Şelatlı Çinko (Zn)	%0,1
	%0,1

Klor İçeriği (Cl) %0,1

ŞELAT AJANI : EDTA

Şelatın stabil pH aralıkları 2-10.

ÖZELLİKLER

Floral K, özellikle tüm tarımsal mahsullerin geç biyolojik aşamaları için belirtilen bir yaprak emilim gübresidir. İçerdiği besin maddelerinin yüksek saflığı ve kalitesi, ürünün tam çözünürlüğünü ve düşük tuzlu çözelti elde etmeyi sağlar. FLORAL K kullanımı tüm ürünler için uygundur.

UYGULAMA DOZAJLARI ve KULLANIMI

Yapraklı uygulamalar

Şaraplık ve sofralık üzüm: 300/350 g/hl su, meyve kararmasından başlayarak her 15 günde hasattan 2 hafta öncesine kadar uygulayın.

Elma, armut, şeftali, erik, kayısı, badem, kiraz: 300-350 g/hl su hasat öncesinde 15-20 güne kadar küçük meyvelerden, yaz mantarı öldüren ilaçları ile.

Narenciye: 350-400 g/hl su, meyvelerin büyüme aşamasından hasat öncesi 15-20 güne kadar uygulayın.

Kivi: 300-350 g/hl su yaz ve sonbahar dönemlerinde her 15 günde bir uygulayınız. Ağustos ayında uygulamaları durdurunuz.

Zeytin: 300-350 g/hl su yağ içeriği arttırmak için, hasat zamanına kadar her 15 günde bir çekirdeklerin sertleşmesi için uygulayınız.

Çilek: 250-300 g/hl. Her 12-15 günde bir çiçeklenme sonrası dönemi esnasında 2-3 kez uygulayınız.

Sebzeler: 300-350 g/hl su meyve ya da yumru veren sebzelerde (domates, biber, patates vs) meyve teşekkülü, irileşmesi ve renklenmesinden itibaren (ya da yumru oluşumundan) her 15 günde bir uygulanır. Yapraklı sebzelerde (havuç, roka vs) her 15 günde bir, bitkilerin tam vejetasyonda olmaları halinde ürünü üzerlerine serpiniz.

Endüstriyel ürünler: (gıda işleme endüstrisi için tütün, pancar, bezelye vs) Normal şartlarda, gerekli su miktarı ile 4-5 kg ürün/ha kullanılır. Zararlı ot yok ediciler ve böcek öldürücü tedaviler ile birlikte işleme döngüsünün son dönemlerinde uygulayınız. Her 15 günde bir 3-4 kez uygulama, ürünün kalitesinin gelişmesi için yeterlidir.

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınar Mah. 61027 Sok. Sancar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok Kat:10 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 66
Mersis No:0209049035500018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir/Adana 2008 049 8355

Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili

FLORAL K 12-5-35 + ME

Fidanlık bitkileri: 250-300 g/hl su Son aşamalar esnasında ya da kış bitiminden önce uygulayınız. Kesme çiçekler olarak kullanılan ürünler yerine, tomurcuk oluşumundan hasat zamanına kadar uygulayınız.

Tropikal bitkiler: 250-300 g/hl su Her 15 günde bir ya da her ay, meyvelerin yumru başlangıcından hasat zamanına kadar uygulayınız. FLORAL K, aynı zamanda fertigasyon yoluyla da kullanılabilir, bu durumda, hektar başına dozlar artırılmalıdır ve her mahsulün besinsel ihtiyaçlarına göre orantılanmalıdır. Uygulama süresi ile ilgili olarak, yaprak besleme uygulamaları için verilen talimatlara bakınız.

UYUMLULUK

Floral K, beyaz yağlar, yağ bazlı böcek öldürücü ilaçlar ve yüksek alkalın reaksiyonu ile tüm preparatlar istisna olmak üzere, CIFO ürünleri ve zirai ilaçlar ile önerilen dozda karıştırılabilir.

UYARILAR

Korunmuş alanlarda (seralar, tüneller vs) ürünün dozajı her 100 lt su (%0,2) içerisinde 200 gr'ı aşmamalıdır. Uygulama günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

***DİKKAT ÇOCUKLARDAN UZAK TUTUNUZ *GÖZ, YÜZ VE DERİ İLE TEMAS ETTİRMEYİNİZ *ÖNERİLEN DOZAJI AŞMAYINIZ * KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ BOL SU İLE YIKAYINIZ .KULLANILMIŞ OLAN BOŞ AMBALAJLARI BAŞKA AMAÇLARLA KULLANMAYINIZ.**

Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisini dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek kullanıcının (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) sorumluluğundadır.

DEPOLAMA

ÜRÜNÜ SERİN VE KURU BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. ÜRÜNÜ DİREKT GÜNEŞ IŞIĞINA MARUZ BIRAKMAYINIZ. DEPOLARDA SIGARA İÇMEYİNİZ. DEPOLAMA SICAKLIĞI: +4 / +40° C (DERECE) OLMALIDIR.

Son kullanma tarihi : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır.

Tescil No : 13313

Lisans No : 1066

Parti No:

Üretim Tarihi:

İtalya'dan İthal Edilmiştir.

NET AĞIRLIK :

ÜRETİCİ FİRMA:

CIFO S.R.L

Via Oradour 6/8

San Giorgio di Piano (BO) ITALY

Production plant of San Giorgio di Piano (BO)

İTHALATÇI FİRMA:

CİFAGRO TARIM İLAÇ VE GÜBRE ÜRÜNLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA LTD. ŞTİ.

Çınarlı Mah.61027 Sokak Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi

A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/Adana TURKEY

Tel: +90 322 456 25 56 Fax: +90 322 456 25 66



Piyasaya sunacağımız etiket ile aynı ölçüde taahhüt eder. Aksinin ispatı halinde, ilgili kanuna göre hükümlerde yapılacak cezai işlemi kabul ederiz.

CİFAGRO

Tarım İlaç ve Gübre Ürünleri Satış ve Pazarlama Ltd.Şti.
Çınarlı Mah. 61027 Sok. Sunar Nuri Çomu İş ve Alışveriş Merkezi
A Blok No:18 İç Kapı No:81 Seyhan/ADANA Tel:0322 456 25 56
Merkezi No:0202049035600018 Tic.Sic.No:54093
Yüreğir V.D.: 209 049 0355


Durmuş DEMİREL
Şirket Vekili